

Zánětlivá onemocnění střev - nejobvyklejší je **zánět červovitého přívěsku slepého střeva** (appendicitis). Toto chirurgické onemocnění postihuje nejčastěji děti. Dochází k nespecifickému zánětu v oblasti appendixu, který obsahuje velké množství lymfatické tkáně (proto termín tonsilla abdominalis). Etiologie není zcela jasná, vyšší výskyt je v oblastech s nízkým podílem vlákniny v potravě. Někdy je uváděna souvislost s výskytem parazitů, nebo obstrukcí tenkého průsvitu apendixu. Klinicky jde o náhlou břišní příhodu, která vyžaduje chirurgický výkon spočívající k odstranění appendixu (appendectomy). Pokud není zánět apendixu léčen zánět se šíří stěnou do okolí, perforací stěny dochází k zánětu pobřišnice (peritonitis), který může být ohraničený nebo difúzní. Jde o život ohrožující stav.

Zánět obvykle začíná jako katarální, který může odeznít, nebo pokračuje jako hnisavý, kdy leukocyty infiltrují stěnu, může dojít k ulceraci, zánět se flegmonózně šíří, dochází k trombóze tepny vyživující stěnu červovitého přívěskum, ta následně propadá gangréně a dochází k perforaci stěny s rozvojem zánětu pobřišnice.

Chronické záněty střev - Crohnova choroba a ulcerózní kolitis

Diverculitis